

AIFP FACT SHEET

Adherence k léčbě v číslech


Míra dodržování léčebného režimu ze strany pacienta (tzv. adherence) trápí v současné době celý svět. Z průzkumu provedeného agenturou STEM/MARK mezi českými pacienty vyplynulo, že každý desátý Čech nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Čtvrtina dotazovaných přiznala, že někdy užívá léky v jiné dávce než doporučené. Pouze polovina Čechů užívá léky skutečně disciplinovaně. Nedodržování pokynů lékaře v případě užívání léčiv přitom představuje závažný problém. „*Nesprávné užívání léků, jejich vynechávání či kombinace s dalšími přípravky mohou v některých případech vést k ohrožení zdraví pacienta a prodloužení či úplnému selhání léčby. Nehledě na velkou zátěž pro národní zdravotnický systém,*“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léčivé přípravky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA) a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA).

V roce 2014 AIFP sdružuje 30 členských společností. Více informací naleznete na www.aifp.cz

DODRŽOVÁNÍ INSTRUKCÍ LÉKAŘE / V PŘÍBALOVÉM LETÁKU

Užíváte léky na předpis dle instrukcí lékaře / v příbalovém letáku?




- **83 % Čechů užívá léky pravidelně** podle doporučení lékaře či podle příbalového letáku.
- **11 % obyvatel** tyto instrukce **nikdy nebo téměř nikdy nedodržuje.**
- Příbalovou informaci čte vždy nebo většinou 80 % Čechů. Pouze 5 % z nich příbalový leták ignoruje.

(Zdroj: STEM/MARK)

UŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÉ DÁVKY

Užíváte lék na předpis v dávce doporučené lékařem?



Ohledně úprav dávkování předepsaných léků jsou Češi z velké části disciplinovaní:

- **75 % obyvatel** ČR vždy dodržuje doporučené dávkování
- **23 % většinou** dodržuje doporučené dávkování předepsaných léčiv.
- **2 %** dotázaných si samo upravuje dávkování.

(Zdroj: STEM/MARK)

FAKTORY SNIŽUJÍCÍ ÚČINNOST LÉKŮ

- **63 %** Čechů si myslí, že největší dopad na účinnost léků má užívání alkoholu.
- Jako další důvody uvádějí Češi chyby v užívání a skladování léků.
- Naopak **pouze 11 %** lidí se mylně domnívá, že bylinky a přírodní „léčiva“ nemají vliv na působení léků na předpis.

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ LÉKŮ

- Jako nejčastější následek nesprávného užívání léků uvádí **přes 90 % dotazovaných** prodloužení chorobného stavu, tj. selhání léčby nebo její prodloužení.
- **Méně než 30 %** Čechů vnímá, že tato skutečnost vede ke zvýšení nákladů na zdravotní systém a k častějším návštěvám lékaře.

(Zdroj: STEM/MARK)

Pro další informace, prosím, kontaktujte:



Mgr. Michal Kaderka

PR Manager

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

E-mail: michal.kaderka@aifp.cz

Tel: 224 832 552, 734 623 626